

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению лекарственного препарата**  
**АНТИГРИППИН**

**Регистрационный номер:** ЛСР-005321/08 от 07.07.2008 г.

**Торговое наименование:** Антигриппин

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Парацетамол + Хлорфенамин + [Аскорбиновая кислота]

**Лекарственная форма:** таблетки шипучие со вкусом малины, таблетки шипучие со вкусом грейпфрута, таблетки шипучие со вкусом апельсина.

**Состав на одну таблетку со вкусом малины:**

*Действующие вещества:*

парацетамол - 500,00 мг

хлорфенамина малеат - 10,00 мг

аскорбиновая кислота - 200,00 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат, лимонная кислота, сорбитол, повидон К30, натрия сахаринат, аспартам, натрия карбонат, макрогол, натрия лаурилсульфат, рибофлавин-5-фосфат натрия, ароматизатор малиновый (ароматическая фруктовая добавка «Малина»), корректор вкуса, порошок сока красной свеклы.

**Состав на одну таблетку со вкусом грейпфрута:**

*Действующие вещества:*

парацетамол - 500,00 мг

хлорфенамина малеат - 10,00 мг

аскорбиновая кислота - 200,00 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат, лимонная кислота, сорбитол, повидон К30, аспартам, натрия карбонат, макрогол, натрия лаурилсульфат, ароматизатор лимонный (ароматическая фруктовая добавка «Лимон»), ароматизатор грейпфрутовый (ароматическая фруктовая добавка «Грейпфрут»), корректор вкуса.

**Состав на одну таблетку со вкусом апельсина:**

*Действующие вещества:*

парацетамол - 500,00 мг

хлорфенамина малеат - 10,00 мг

аскорбиновая кислота - 200,00 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат, лимонная кислота, сорбитол, повидон К30, натрия сахаринат, аспартам, натрия карбонат, макрогол, натрия лаурилсульфат, бета-каротин 1 %, ароматизатор апельсиновый (ароматическая фруктовая добавка «Апельсин»), корректор вкуса.

**Описание:**

*Таблетки шипучие со вкусом малины:*

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки с фаской и разделительной риской с одной стороны, розового, розовато-фиолетового или фиолетового цвета, с более светлыми и темными вкраплениями, со специфическим фруктовым запахом.

*Таблетки шипучие со вкусом грейпфрута:*

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки с фаской и разделительной риской с одной стороны, белого, почти белого или белого с коричневатым оттенком цвета, с мраморностью, со специфическим цитрусовым запахом.

*Таблетки шипучие со вкусом апельсина:*

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки с фаской и разделительной риской с одной стороны, от светло-оранжевого до оранжевого цвета, с мраморностью, с апельсиновым запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство для устранения симптомов ОРЗ и «простуды» (анальгезирующее ненаркотическое средство + витамин + H1-гистаминовых рецепторов блокатор).  
Код АТХ [N02BE51]

**Фармакологические свойства:**

Комбинированный препарат. *Парацетамол* обладает анальгетическим и жаропонижающим действием; устраняет головную и другие виды боли, снижает повышенную температуру. *Аскорбиновая кислота (витамин С)* участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, повышает сопротивляемость организма.

*Хлорфенамин* – блокатор H1-гистаминовых рецепторов, обладает противоаллергическим действием, облегчает дыхание через нос, снижает чувство заложенности носа, чихание, слезотечение, зуд и покраснение глаз.

**Показания к применению:**

Инфекционно-воспалительные заболевания (ОРВИ, грипп), сопровождающиеся повышенной температурой, ознобом, головной болью, болями в суставах и мышцах, заложенностью носа и болями в горле и пазухах носа.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к парацетамолу, аскорбиновой кислоте, хлорфенамину или любому другому компоненту препарата.

Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в фазе обострения).

Выраженная почечная и/или печеночная недостаточность.

Алкоголизм.

Закрывтоугольная глаукома.

Фенилкетонурия.

Гиперплазия предстательной железы.

Детский возраст (до 15 лет).

Беременность (I и III триместр) и период лактации.

С осторожностью – почечная и/или печеночная недостаточность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора), гипероксалурия, прогрессирующие злокачественные заболевания, вирусный гепатит, алкогольный гепатит, пожилой возраст.

**Способ применения и дозы:**

Внутрь. Взрослым и детям старше 15 лет по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Таблетку следует полностью растворить в стакане (200 мл) теплой воды (50-60 °С) и полученный раствор сразу выпить. Лучше принимать препарат между приемами пищи. Максимальная суточная доза – 3 таблетки. Интервал между приемами препарата должен быть не менее 4 часов.

У пациентов с нарушениями функции печени или почек и у пожилых больных интервал между приемами препарата должен составлять не менее 8 часов.

**Продолжительность приема без консультации с врачом не более 5 дней при назначении в качестве обезболивающего средства и 3-х дней в качестве жаропонижающего средства.**

**Побочные эффекты:**

Препарат хорошо переносится в рекомендованных дозах.

В единичных случаях встречаются:

*со стороны ЦНС:* головная боль, чувство усталости;

*со стороны ЖКТ:* тошнота, боль в эпигастральной области;

*со стороны эндокринной системы:* гипогликемия (вплоть до развития комы);

*со стороны органов кроветворения:* анемия, гемолитическая анемия (особенно для пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы); крайне редко – тромбоцитопения;

*аллергические реакции:* кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке, анафилактические реакции (в т.ч. анафилактический шок), мультиформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла);

*прочие:* гипервитаминоз, нарушение обмена веществ, ощущение жара, сухость во рту, парез аккомодации, задержка мочи, сонливость.

Обо всех побочных эффектах препарата следует сообщать врачу.

### **Передозировка:**

Симптомы передозировки препаратом обусловлены входящими в его состав веществами. Клиническая картина острой передозировки парацетамолом развивается в течение 6-14 часов после его приема. Симптомы хронической передозировки проявляются через 2-4 суток после повышения дозы препарата. *Симптомы острой передозировки парацетамола:* диарея, снижение аппетита, тошнота и рвота, дискомфорт в брюшной полости и/или абдоминальная боль, повышение потоотделения.

*Симптомы передозировки хлорфенамина:* головокружение, возбуждение, нарушения сна, депрессия, судороги.

*Лечение:* симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и тетрациклинов.

Улучшает всасывание в кишечнике препаратов железа (переводит трехвалентное железо в двухвалентное); может повышать выведение железа при одновременном применении с дефероксамином.

Увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия, замедляет выведение почками кислот, повышает выведение ЛС, имеющих щелочную реакцию (в т.ч. алкалоидов), снижает концентрацию в крови пероральных контрацептивов. Повышает общий клиренс этанола.

Этанол усиливает седативное действие антигистаминных препаратов.

Антидепрессанты, противопаркинсонические средства, антипсихотические средства (производные фенотиазина) – повышают риск развития побочных эффектов (задержка мочи, сухость во рту, запоры). Глюкокортикостероиды – увеличивают риск развития глаукомы.

При одновременном применении уменьшает хронотропное действие изопrenalина.

Может как повышать, так и снижать эффект антикоагулянтных препаратов.

Уменьшает терапевтическое действие антипсихотических препаратов (нейролептиков) – производных фенотиазина, канальцевую реabsорбцию амфетамина и трициклических антидепрессантов.

Индукторы микросомального окисления в печени (фенитоин, этанол, барбитураты, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты) увеличивают продукцию гидроксилированных активных метаболитов, что обуславливает возможность развития тяжелых интоксикаций при небольших передозировках. Этанол способствует развитию острого панкреатита.

Ингибиторы микросомального окисления (в т.ч. циметидин) снижают риск гепатотоксического действия. Одновременный прием препарата и дифлунисала повышает концентрацию в плазме крови парацетамола на 50 %, повышается гепатотоксичность. Одновременный прием барбитуратов снижает эффективность парацетамола, повышает выведение аскорбиновой кислоты с мочой.

Парацетамол снижает эффективность урикозурических препаратов.

Усиливает действие снотворных лекарственных средств.

**Особые указания:**

При приеме метоклопрамида, домперидона или колестирамина также необходимо проконсультироваться с врачом.

При длительном применении в дозах, значительно превышающих рекомендованные, повышается вероятность нарушения функции печени и почек, необходим контроль периферической картины крови.

Парацетамол и аскорбиновая кислота могут искажать показатели лабораторных исследований (количественное определение содержания глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови, билирубина, активности «печеночных» трансаминаз, ЛДГ).

Во избежание токсического поражения печени парацетамол не следует сочетать с приемом алкогольных напитков, а также принимать лицам, склонным к хроническому потреблению алкоголя. Риск развития повреждений печени возрастает у больных с алкогольным гепатозом.

Назначение аскорбиновой кислоты пациентам с быстро пролиферирующими и интенсивно метастазирующими опухолями может усугубить течение процесса. У пациентов с повышенным содержанием железа в организме следует применять аскорбиновую кислоту в минимальных дозах.

**Форма выпуска:**

Таблетки шипучие со вкусом малины 500 мг + 10 мг + 200 мг, таблетки шипучие со вкусом грейпфрута 500 мг + 10 мг + 200 мг, таблетки шипучие со вкусом апельсина 500 мг + 10 мг + 200 мг.

*Таблетки шипучие со вкусом малины, таблетки шипучие со вкусом грейпфрута:* по 10 таблеток в пластиковом пенале; по 1, 2, 4 или 6 таблеток в стрипе из Ал/Ал.

По 1, 3, 5, 6, 10, 15, 20 стрипов в картонной пачке вместе с инструкцией по применению. По 1 пеналу в картонной пачке с внутренней перегородкой вместе с инструкцией по применению.

*Таблетки шипучие со вкусом апельсина:* по 10 таблеток в пластиковом пенале. По 1 пеналу в картонной пачке с внутренней перегородкой вместе с инструкцией по применению.

**Условия хранения:**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности:**

3 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска:** без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения:**

ООО «Бауш Хелс», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.

**Производитель:**

Натур Продукт Фарма Сп. з о.о.,  
ул. Подсточиско, 30, 07-300 Острив Мазовецка, Польша.

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Бауш Хелс», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия,  
тел./факс: +7 (495) 510-28-79.